





# Informationsblatt: Scheitelpunktform quadratischer Funktionen

Mit Hilfe der Scheitelpunktform einer quadratischen Funktion kann der Scheitelpunkt der zugehörigen Parabel ganz einfach bestimmt werden. Um von der allgemeinen Form einer quadratischen Funktion  $f$  mit  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , auf die Scheitelpunktform zu kommen, gibt es zwei gängige Wege. Beispiel:  $f(x) = -0,6x^2 + 3,6x - 3$



## Der kurze Weg

Die Koordinaten des Scheitelpunkts  $S(x_s|y_s)$  der zugehörigen Parabel können durch die folgenden Formeln einfach berechnet werden.

$$x_s = -\frac{b}{2a} \text{ und } y_s = f(x_s)$$

Um  $x_s$  zu erhalten müssen wir also lediglich die entsprechenden Werte aus der allgemeinen Form einsetzen. Beispiel:  $f(x) = -0,6x^2 + 3,6x - 3 \rightarrow b = 3,6$  und  $a = -0,6$

$$\rightarrow x_s = -\frac{3,6}{2 \cdot (-0,6)} = 3$$

$y_s$  erhält man dann, indem man  $x_s = 3$  in die allgemeine Funktionsgleichung einsetzt:

$$\rightarrow y_s = -0,6 \cdot 3^2 + 3,6 \cdot 3 - 3 = 2,4 \rightarrow S(3|2,4)$$

Damit kann die Scheitelpunktform dann ganz einfach angegeben werden.


$$\text{Scheitelpunktform: } f(x) = a(x - x_s)^2 + y_s$$

$$\rightarrow f(x) = -0,6(x - 3)^2 + 2,4$$



## Der lange Weg

Als Beispiel betrachten wir die Funktion  $f$  mit  $f(x) = -0,6x^2 + 3,6x - 3$ . Der Graph dieser Funktion ist im Folgenden abgebildet.



Neben der allgemeinen Form, kann eine quadratische Funktion auch in der sogenannten Scheitelpunktform dargestellt werden. Das funktioniert mithilfe der quadratischen Ergänzung. Im vorliegenden Beispiel sieht das folgendermaßen aus:

$$f(x) = -0,6x^2 + 3,6x - 3$$

$$f(x) = -0,6(x^2 + 6x + 5) \quad (\text{ausklammern})$$

$$f(x) = -0,6(x^2 - 2 \cdot 3x + 5)$$

$$f(x) = -0,6(x^2 - 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2 + 5) \quad (\text{zu einer binomischen Formel umformen})$$

$$f(x) = -0,6((x - 3)^2 - 3^2 + 5) \quad (\text{eine binomische Formel anwenden})$$

$$f(x) = -0,6((x - 3)^2 - 4) \quad (\text{vereinfachen})$$

$$f(x) = -0,6((x - 3)^2 + 2,4)$$

Mithilfe der Scheitelpunktform können die Koordinaten des sogenannten **Scheitelpunktes** einer Parabel abgelesen werden. Allgemein kann man eine quadratische Funktion in der

Scheitelpunktform folgendermaßen darstellen:  $f(x) = a(x - x_s)^2 + y_s$

$x_s$  beschreibt dabei die x-Koordinate des zugehörigen Scheitelpunktes.

$y_s$  beschreibt dabei die y-Koordinate des zugehörigen Scheitelpunktes.

$a$  entspricht dem  $a$  aus der allgemeinen Form  $f(x) = ax^2 + bx + c$



[Hier wird die quadratische Ergänzung nochmal erklärt.](#)

